

학부모님, 자녀가 보육 또는 프리스쿨에 나갈 준비가 되었습니까?



지침: 보육 및 유치원에 대해 어떤 백신이 필수인지 알아보시려면, 자녀의 연령을 찾아 해당 줄에 있는 필수 백신 및 접종 횟수를 살펴보십시오. 준수를 위해서는 자녀가 최소한의 접종 주기 및 연령 기준에 부합해야 합니다. 질문이 있으실 경우 의료 제공자, 보육 또는 유치원과 논의하십시오. www.doh.wa.gov/scci

	Hepatitis B (B 형 간염)	DTaP (디프테리아, 파 풍, 백일해)	Hib (B 형 헤모필루스 인 플루엔자)	Polio (소아마비)	PCV (폐렴 구균 결합 백 신)	MMR (홍역, 유행성 이하 선염, 풍진)	Varicella (수두)
3 개월	2 회	1 회	1 회	1 회	1 회	12 개월 이하 연령에는 투여 불가	12 개월 이하 연령에는 투여 불가
5 개월	2 회	2 회	2 회	2 회			
7 개월	2 회	3 회	3 회	2 회	3 회		
16 개월	2 회	3 회	4 회	2 회	4 회	1 회	1 회
19 개월	3 회	4 회	4 회	3 회	4 회	1 회	1 회
7 세 또는 유치 원생	3 회	5 회	의학적 상태가 있지 않은 이상 5 세 이하 에는 투여 금지	4 회	의학적 상태가 있지 않은 이상 5 세 이하 에는 투여 금지	2 회	2 회

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127로 전화하십시오. 청각 장애가 있는 고객은 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일 civil.rights@doh.wa.gov로 연락하시면 됩니다.